

**ABSTRAK**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN**  
**BINA HUSADA PALEMBANG**  
**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN**  
**Skripsi, FEBRUARI 2024**

**DIAN AYU LIZTIAH**

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KECEMASAN  
PASIEN KEMOTERAPI DI RUANG RAMBANG 1 RSUP Dr. MOHAMMAD  
HOESIN PALEMBANG**

**(xiv, 97 halaman, 10 tabel, 2 bagan, 8 lampiran)**

Kanker merupakan penyakit katastrofik yang insidensi nya terus meningkat di dunia dalam beberapa dekade terakhir ini, sekaligus menjadi penyebab kematian tertinggi kedua setelah penyakit jantung. Salah satu terapi modalitas untuk kanker adalah kemoterapi. Pelaksanaan kemoterapi terkadang membutuhkan waktu yang lama dan berulang, sehingga efek samping pada pasien munculnya kelelahan, depresi dan kecemasan.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan pasien kemoterapi di Ruang Rambang 1 RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang. Sampel penelitian ini berjumlah 93 orang dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dari hasil penelitian didapat data jumlah responden terbanyak pada usia 41 – 65 tahun sebanyak 58 orang responden ( 62,4 % ). Sebanyak 50 orang responden tingkat pendidikan menengah ( 50 % ). Untuk pasien yang sudah pernah kemoterapi sebanyak 56 orang ( 60,2 % ). Dan untuk pasien adaptif sebanyak 65 orang ( 69,9 % ). Dari seluruh responden di dapat bahwa 39 orang responden ( 41,9 ) % mengalami tingkat kecemasan sedang.

Berdasarkan hasil penelitian di dapat bahwa tidak ada hubungan antara usia dengan dengan tingkat kecemasan dengan nilai p value 0,083, ada hubungan pendidikan dengan tingkat kecemasan dengan nilai p value 0,000, ada hubungan antara pengalaman dengan tingkat kecemasan ( p value 0,000 ) dan yang terakhir ada hubungan antara tingkat adaptasi dengan tingkat kecemasan ( p value 0,000 ).

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan referensi bagi perawat dan juga para staf rumah sakit untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan pasien kemoterapi RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, agar perawat dapat secara komprehensif menilai tingkat kecemasan dan menentukan penatalaksanaan yang tepat sesuai dengan tingkat kecemasan pasien khususnya pada pasien yang akan menjalani tindakan kemoterapi

**Daftar Pustaka : 33 ( 2014 – 2022 )**

**Kata Kunci : Faktor – faktor, Tingkat kecemasan, Pasien kemoterapi**

**DIAN AYU LIZTIAH**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN**  
**BINA HUSADA PALEMBANG**  
**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN**  
**Skripsi, MARET 2024**

Factors that reduce the degree of weakness of chemotherapeutic patients in the first room Dr. Mohammad Hoesin Palembang

(xiv, 97 pages, 10 tables, 2 charts, 8 attachments)

Cancer is a catastrophic disease whose incidence has steadily increased worldwide in recent decades, and is the second highest cause of death after heart disease. One of the modal therapies for cancer is chemotherapy. Implementation of chemotherapies sometimes takes a long time and is repeated, so side effects in patients include the appearance of fatigue, depression and anxiety.

The research is aimed at identifying factors that influence the level of anxiety of chemotherapy patients in Rambang Room 1 of RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang. The sample consisted of 93 people using purposive sampling techniques. According to the study, the highest number of respondents were between 41 and 65 years of age (58 respondents, 62.4%), 50 respondents had a secondary education level (50%) and 56 patients had previously undergone chemotherapy (60.2%) and 65 were adaptive patients (69.9%). Out of all respondents, 39 respondents (41.9%) had moderate levels of anxiety.

Based on the results of the study, there is no relationship between age and anxiety with a p value of 0.083, there is a relationship between education and the p value of a 0,000, there are relationships between experience and the 0,000 and the latter is the relationship between the rate of adaptation and the 0.0,000. It is hoped that the results of this study can be used as an additional reference for nurses and also the hospital staff to know the factors affecting the level of anxiety of patients with chemotherapy, according to Dr. Mohammad Hoesin Palembang, so that the nurse can comprehensively assess the degree of emergency and determine the appropriate implementation according to the level to which the patient is anxious, especially in patients who are going to undergo chemotherapeutic interventions.

**Library List: 33 ( 2014 – 2022 )**

**Keywords: Factors, Anxiety Level, Chemotherapy Patien**