

ABSTRAK

SEKOLAT TINGGI ILMU KESEHATAN

BINA HUSADA PALEMBANG

PROGRAM STUDI KEPERAWATAN

Skripsi, April 2024

(VII+ 45 HALAMAN + 5 TABEL)

Pengaruh terapi psikoreligius dzikir untuk menurunkan tingkat halusinasi di Yayasan bagus mandiri insani Kota palembang

Halusinasi adalah persepsi sensori yang salah dan tidak terkait dengan rangsangan eksternal yang nyata. Klien akan sulit membedakan apakah rangsangan yang timbul berasal dari interna (pikiran atau perasaan) atau dari stimulus external. Keadaan ini mungkin melibatkan salah satu dari pancha indra. Halusinasi biasanya terjadi pada klien dengan gangguan terkait zat, skizofrenia dan gangguan manik.

Tujuan penlitian ini adalah diketahuinya pengaruh pengaruh terapi psikoreligius dzikir untuk menurunkan tingkat halusinas. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dalam penelitian ini menggunakan rancangan penelitian *pre eksperimental* dengan *one group pre-test* dan *Post test*.

Hasil penelitian diketahui bahwa setelah dilakukan terapi psikoreligius dzikir didapatkan nilai sig (2 tailed) 0,000 ($p<0,05$). Hal ini dapat disimpulkan bahwa ada Pengaruh terapi psikoreligius dzikir pada pasien halusinasi di Yayasan Bagus Mandiri Insani Kota Palembang Tahun 2024.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh terapi psikoreligius dzikir untuk menurunkan tingkat halusinasi di yayasan bagus mandiri insani tahun 2024. maka disarankan dapat menerapkan terapi psikoreligius dzikir untuk mengurangi halusinasi pendengaran pada pasien di Yayasan Bagus Mandiri Insani dapat dijadikan sebagai program inovasi dalam menurunkan tingkat halusinasi yang dapat diterapkan seminggu tiga kali di Yayasan Bagus Mandiri Insani.

ABSTRACT
BINA HUSADA HIGH SCHOOL
HEALTH SCIENCES PALEMBANG
NURSING STUDIES PROGRAM
Thesis, April 2024
(VII + 45 PAGES + 5 TABLE)

The effect of psychoreligious dhikr therapy to reduce the level of hallucinations a the bagus mandiri human foundation, palembang city

Hallucinasi are false sensory perceptions and are not related to real external stimuli. Clients will find it difficult to distinguish whether the stimulation that arises comes from internal (thoughts or feelings) or from external stimulus. This situation may involve one of the five senses. Hallucinations usually occur in clients with substance -related disorders, schizophrenia and mania disorders.

The aim of this research, is to find out the influence of psychoreligious dhikr therapy to reduce the level of hallucinations. Research is a quantitative research, in this research a pre - experimental research design was used with one group pre test and post test.

The results of the research, showed that after carrying out dhikr psychoreligious therapy, a sig value (2 tailed) was 0, 000($p<0, 05$). it can be concluded that there was an effect of dhikr psychoreligious therapy on hallucinogenic patients at the bagus mandiri insan foundation, palembang city in 2024.

Based on the research results, it can be concluded that there is an effect of dzikir psychoreligious therapy to reduce the level of hallucinations in yayasan bagus mandiri insan foundation. This can be used as an innovation program in the level of hallucinations. Can be applied three times a week at yayasan bagus mandiri insan.